



Tratamiento de la enfermedad de tuberculosis (activa) Formulario educativo para los pacientes

PHN _____

Nº de teléfono _____

Esta información tiene como fin educar acerca del tratamiento, los efectos secundarios y los riesgos de tomar medicamentos para la enfermedad de tuberculosis activa. El tratamiento de la enfermedad de TB con los fármacos recetados curará la mayoría de los casos de la enfermedad. Estos medicamentos deben tomarse según la receta y las instrucciones de su médico.

Medicamento	Posibles efectos secundarios	Comentarios
Isoniazid (INH)	Orina oscura, heces pálidas, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, piel u ojos amarillentos, exantema, hormigueo o espasmos musculares en las manos o los pies.	Llame a su médico o enfermero si tiene alguno de estos efectos secundarios. Debido al riesgo de daño hepático, no consuma alcohol. No tome Tylenol (acetaminofén) ni ningún otro medicamento con Tylenol mientras se encuentre tomando INH. Puede tomar Ibuprofeno, Aleve o Advil. Evite los antiácidos (Maalox, Tums, Mylanta) dentro de las 2 horas posteriores a la toma de INH. Dígale a su médico o enfermero si queda embarazada mientras esté tomando INH.
Rifampicina (RIF)	Fluidos corporales color naranja, síntomas similares a una gripe, náuseas, vómitos, dolor abdominal, problemas de sangrado, fiebre, heces pálidas, exantema, piel u ojos amarillentos, fatiga, sangre en la orina, formación rápida de hematomas.	Debido al riesgo de daño hepático, no consuma alcohol . Puede haber interacciones importantes con metadona, anticonceptivos, digoxina, derivados de cumarina, anticonvulsivantes y muchos otros fármacos. La RIF teñirá los fluidos corporales de naranja (sudor, lágrimas, orina) y puede decolorar permanentemente los lentes de contacto. Dígale a su médico o enfermero si queda embarazada mientras esté tomando RIF.
Pirazinamida (PZA)	Orina oscura, heces pálidas, ojos o piel amarillenta, dolor articular, náuseas, vómitos, fatiga, exantema, fotosensibilidad, gota.	Debido al riesgo de daño hepático, no consuma alcohol . Tome muchos fluidos no alcohólicos. Puede provocar niveles elevados de ácido úrico. Dígale a su médico o enfermero si queda embarazada mientras esté tomando PZA.
Etambutol (EMB)	Cambios en la visión, la capacidad para ver o distinguir colores, exantema cutáneo.	Debido al riesgo de daño hepático, no consuma alcohol . No se recomienda EMB para niños que sean demasiado pequeños para controlar los cambios en la visión. Dígale a su médico o enfermero si queda embarazada mientras esté tomando EMB.

Llame a su médico o enfermero si experimenta cualquiera de los efectos secundarios anteriores o tiene alguna otra pregunta.

Leí las instrucciones de este formulario sobre el tratamiento de la enfermedad de TB. Tuve una oportunidad de hacer preguntas que fueron respondidas aceptablemente. Creo que entiendo los beneficios y riesgos de tomar estos medicamentos.

Otros materiales educativos proporcionados _____

Nombre del paciente (en imprenta) _____

Fecha de nacimiento _____

Firma del paciente (o tutor) _____ Fecha _____

Firma del PHN _____ Fecha _____