



Tratamiento de la infección con tuberculosis (latente) Formulario educativo para los pacientes

PHN _____

N° de teléfono _____

Esta información tiene como fin educar acerca del tratamiento, los efectos secundarios y los riesgos de tomar medicamentos para la infección con tuberculosis latente. El tratamiento de la infección de TB con los medicamentos recetados evitará que se desarrolle la enfermedad de TB en la mayoría de las personas. Estos medicamentos deben tomarse según la receta y las instrucciones de su médico.

Medicamento	Posibles efectos secundarios	Comentarios
Isoniazid (INH)	Orina oscura, heces pálidas, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, piel u ojos amarillentos, exantema, hormigueo o espasmos musculares en las manos o los pies.	Llame a su médico o enfermero si tiene alguno de estos efectos secundarios. Debido al riesgo de daño hepático, no consuma alcohol. No tome Tylenol (acetaminofén) ni ningún otro medicamento con Tylenol mientras se encuentre tomando INH. Puede tomar Ibuprofeno, Aleve o Advil. Evite los antiácidos (Maalox, Tums, Mylanta) dentro de las 2 horas posteriores a la toma de INH. Dígale a su médico o enfermero si queda embarazada mientras esté tomando INH.
Rifampicina (RIF)	Fluidos corporales color naranja, síntomas similares a una gripe, náuseas, vómitos, dolor abdominal, problemas de sangrado, fiebre, heces pálidas, exantema, piel u ojos amarillentos, fatiga, sangre en la orina, formación rápida de hematomas.	Debido al riesgo de daño hepático, no consuma alcohol . Puede haber interacciones importantes con metadona, anticonceptivos, digoxina, derivados de cumarina, anticonvulsivantes y muchos otros fármacos. La RIF teñirá los fluidos corporales de naranja (sudor, lágrimas, orina) y puede decolorar permanentemente los lentes de contacto. Dígale a su médico o enfermero si queda embarazada mientras esté tomando RIF.
Rifapentina (RPT)	Pérdida de apetito inexplicable, náuseas, vómitos, orina oscura, piel u ojos amarillentos, insensibilidad persistente en las manos o los pies, debilidad, fatiga, fiebre, dolor abdominal con la palpación, formación rápida de moretones o sangrado.	Llame a su médico o enfermero si tiene alguno de estos efectos secundarios. La RPT puede reducir los niveles en sangre de muchos fármacos, incluidos los anticonceptivos, warfarina, sulfonureas y metadona. Debido al riesgo de daño hepático, no consuma alcohol. Dígale a su médico o enfermero si queda embarazada o está pensando en quedar embarazada.

Llame a su médico o enfermero si experimenta cualquiera de los efectos secundarios anteriores o tiene alguna otra pregunta.

Leí las instrucciones de este formulario sobre el tratamiento de la enfermedad de TB. Tuve una oportunidad de hacer preguntas que fueron respondidas aceptablemente. Creo que entiendo los beneficios y riesgos de tomar estos medicamentos. Entiendo que si no finalizo la terapia, tendré un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de TB infecciosa y no se me proporcionará una constancia de tratamiento.

Otros materiales educativos proporcionados _____

Nombre del paciente (en imprenta) _____

Fecha de nacimiento _____

Firma del paciente (o tutor) _____ Fecha _____

Firma de PHN _____ Fecha _____