

## **Tratamiento de la gonorrea con CEFTRIAXONA, instrucciones para pacientes**

Está recibiendo tratamiento para la gonorrea. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede contraer al tener relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) con una persona que ya la tiene. En función de su resultado positivo, usted estuvo expuesto. La buena noticia es que se trata fácilmente.

### **Por lo general, las ETS no tienen síntomas. Cuando aparecen síntomas, estos pueden incluir:**

- Secreción del pene, de la vagina o del ano
- Dolor al orinar o al tener relaciones sexuales
- Dolor en los testículos (bolas), la pelvis o la parte inferior de la panza

Se le está administrando un medicamento llamado ceftriaxona (también conocido como “Rocephin”) para tratar la gonorrea. Se puede tener más de una ETS a la vez, la ceftriaxona no curará otras infecciones.

### **El medicamento es muy seguro. No obstante, NO LO TOME si se cumple alguno de los siguientes criterios:**

- Tiene fiebre.
- Es mujer y presenta alguno de los siguientes síntomas; dolor en la parte baja del abdomen, dolor durante las relaciones sexuales, vómitos.
- Alguna vez tuvo una reacción grave, como sarpullido, problemas respiratorios o una reacción alérgica después de tomar ceftriaxona u otros antibióticos. Las personas alérgicas a algunos antibióticos pueden ser alérgicas a otros tipos de antibiótico. Si es alérgico a antibióticos, debe consultar con su proveedor de servicios de salud antes de tomar este medicamento.
- Tiene una enfermedad grave a largo plazo, como enfermedad renal, cardíaca o hepática.
- En la actualidad, está tomando otro medicamento recetado.

Si se presenta cualquiera de estas circunstancias, o si no está seguro, **NO** tome este medicamento. En cambio, debe hablar con su proveedor de servicios de salud lo antes posible. Su proveedor de servicios de salud encontrará el mejor tratamiento para usted.

**Si está embarazada, es seguro tomar ceftriaxona, también se recomienda que consulte a su proveedor de servicios de salud.**

### **Posibles efectos secundarios (estos no son todos los efectos secundarios que pueden presentarse):**

- Malestar estomacal leve
- Diarrea
- Mareos
- Náuseas
- Gases
- Candidiasis

**Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presenta signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, lo que incluye entre otros:**

- Dificultad para respirar/opresión en el pecho
- Estrechamiento de la garganta
- Inflamación de los labios o la lengua
- Ampollas (bultos en la piel que pican mucho)

Ahora que tiene su medicamento, **no tenga relaciones sexuales (orales, vaginales, anales) durante los próximos siete días desde que tomó el medicamento.** El medicamento demora siete días en curar la gonorrea. Si tiene relaciones sexuales durante estos primeros siete días, puede transmitir de todos modos la infección a sus parejas sexuales y usted puede volver a infectarse.

### **Próximos pasos:**

- Si tiene otras parejas sexuales, infórmeles que está recibiendo tratamiento para gonorrea, para que también puedan tratarse.
- Si cree que tiene síntomas de infección por gonorrea y no desaparecen al cabo de siete días después de tomar este medicamento, consulte a su proveedor de servicios de salud para realizar otras pruebas y recibir tratamiento. Deberá repetir la prueba en 3 meses o menos para ver si la infección desapareció.
- Es muy probable que las personas que tienen infección por gonorrea una vez vuelvan a tener, es recomendable que se realice una prueba después de cada pareja.
- Si tiene alguna pregunta sobre el medicamento, la gonorrea u otra ETS, llame a su departamento de salud local.
- Use un método de barrera (condones o barrera dental) para prevenir futuras infecciones. Puede encontrar condones gratuitos en [www.KnoWyo.org](http://www.KnoWyo.org).