

## Tratamiento de la sífilis con PENICILINA G BENZATÍNICA, instrucciones para pacientes

Está recibiendo tratamiento para la sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede contraer al tener relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) con una persona que ya la tiene. La sífilis se divide en etapas (primaria, secundaria, latente y terciaria). Cada etapa tiene diferentes signos y síntomas asociados. Si no se trata, la sífilis puede afectar el corazón, el cerebro y otros órganos del cuerpo. La sífilis también puede transmitirla una madre a su hijo por nacer y ser perjudicial para el bebé.

### La sífilis puede no presentar síntomas. Cuando aparecen síntomas, estos pueden incluir:

- Sarpullido
- Inflamación de los ganglios linfáticos
- Llagas indoloras
- Fiebre
- Cambios en la vista

Se le entrega una inyección de un medicamento llamado penicilina G benzatínica (en ocasiones, también llamado “Pen G”) para el tratamiento de la sífilis. Se puede tener más de una ETS a la vez, la penicilina G benzatínica no curará otras infecciones.

### El medicamento es muy seguro. No obstante, NO LO TOME si se cumple alguno de los siguientes criterios:

- Asma o antecedentes de alergias.
- Tiene fiebre.
- Alguna vez tuvo una reacción grave, como sarpullido, problemas respiratorios o una reacción alérgica después de recibir penicilina G benzatínica u otros antibióticos. Las personas alérgicas a algunos antibióticos pueden ser alérgicas a otros tipos de antibiótico. Si es alérgico a antibióticos, debe consultar con su proveedor de servicios de salud antes de tomar este medicamento.
- Tiene una enfermedad grave a largo plazo, como enfermedad renal, cardíaca o hepática.
- En la actualidad, está tomando otro medicamento recetado.

Si se presenta cualquiera de estas circunstancias, o si no está seguro, **NO** tome este medicamento. En cambio, debe hablar con su proveedor de servicios de salud lo antes posible. Su proveedor de servicios de salud encontrará el mejor tratamiento para usted.

**Si está embarazada, es seguro recibir penicilina G benzatínica, también se recomienda que consulte a su proveedor de servicios de salud.**

### Posibles efectos secundarios (estos no son todos los efectos secundarios que pueden presentarse):

- Fiebre
- Escalofríos
- Dolor generalizado
- Dolor de cabeza
- Náuseas/vómitos
- Diarrea
- Mareos
- Visión borrosa
- Fatiga
- Candidiasis

### Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presenta signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, lo que incluye entre otros:

- Dificultad para respirar/opresión en el pecho
- Estrechamiento de la garganta
- Inflamación de los labios o la lengua
- Ampollas (bultos en la piel que pican mucho)

Ahora que tiene su medicamento, **no tenga relaciones sexuales (orales, vaginales, anales) hasta que haya completado el tratamiento y los análisis de sangre indiquen que la infección se ha curado.** Si tiene relaciones sexuales antes de que se cure la infección, puede transmitir de todos modos la infección a sus parejas sexuales y usted puede volver a infectarse.

### Próximos pasos:

- Si tiene otras parejas sexuales, infórmeles que está recibiendo tratamiento para la sífilis, para que también puedan tratarse.
- Es posible que necesite más de una dosis de penicilina G benzatínica.
- Deberá repetir la prueba en 6 meses o menos.
- Es muy probable que las personas que tienen infección por sífilis una vez vuelvan a tener, es recomendable que se realice una prueba después de cada pareja.
- Si tiene alguna pregunta sobre el medicamento, la sífilis u otra ETS, llame a su departamento de salud local.
- Use un método de barrera (condones o barrera dental) para prevenir futuras infecciones. Puede encontrar condones gratuitos en [www.KnoWyo.org](http://www.KnoWyo.org).