

## **Tratamiento de la clamidia con DOXICICLINA, instrucciones del PAQUETE PARA PAREJAS**

Recientemente, su pareja sexual recibió tratamiento para la clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede contraer al tener relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) con una persona que ya la tiene. Usted está en riesgo de tener clamidia y otras ETS. No todas las ETS se curan con este medicamento. Lo mejor es que asista a la clínica para realizar pruebas y recibir tratamiento.

### **Por lo general, las ETS no tienen síntomas. Cuando aparecen síntomas, estos pueden incluir:**

- Secreción del pene, de la vagina o del ano
- Dolor al orinar o al tener relaciones sexuales
- Dolor en los testículos (bolas), la pelvis o la parte inferior de la panza

El tratamiento preferido para la clamidia es que lo observen en una clínica, le realicen una prueba y reciba tratamiento si la prueba de clamidia es positiva. Estas son instrucciones para tomar la doxiciclina. Se puede tener más de una ETS a la vez, la doxiciclina no curará otras infecciones.

### **El medicamento es muy seguro. No obstante, NO LO TOME si se cumple alguno de los siguientes criterios:**

- Tiene fiebre.
- Es mujer y presenta alguno de los siguientes síntomas: dolor en la parte baja del abdomen, dolor durante las relaciones sexuales, vómitos.
- Alguna vez tuvo una reacción grave, como sarpullido, problemas respiratorios o una reacción alérgica después de tomar cefixima, doxiciclina u otros antibióticos. Las personas alérgicas a algunos antibióticos pueden ser alérgicas a otros tipos de antibiótico. Si es alérgico a antibióticos, debe consultar con su proveedor de servicios de salud antes de tomar este medicamento.
- Tiene una enfermedad grave a largo plazo, como enfermedad renal, cardíaca o hepática.
- En la actualidad, está tomando otro medicamento recetado.
- Si está embarazada.

Si se presenta cualquiera de estas circunstancias, o si no está seguro, **NO** tome este medicamento. En cambio, debe hablar con su proveedor de servicios de salud lo antes posible. Su proveedor de servicios de salud encontrará el mejor tratamiento para usted.

**Si está embarazada, NO es seguro tomar la doxiciclina, la cual debe reemplazarse por un medicamento llamado azitromicina. Además, se recomienda que consulte a su proveedor de servicios de salud.**

### **Cómo tomar el medicamento:**

- El frasco de doxiciclina incluye las indicaciones para tomar el medicamento. Siga esas indicaciones.
- Tome el medicamento con alimentos y abundante agua. Esto reducirá las probabilidades de que sienta malestar estomacal y aumentará la cantidad de medicamento que absorba su organismo.
- Cada pastilla de doxiciclina contiene 100 mg de medicamento, tome una pastilla por la mañana y una por la noche hasta tomar las 14 pastillas. Tomar la doxiciclina, según las indicaciones, curará la clamidia.
- NO tome antiácidos (como Tums, Roloids o Maalox) durante una hora antes o dos horas después de tomar las pastillas de doxiciclina.
- No comparta ni administre este medicamento a nadie.

### **Posibles efectos secundarios (estos no son todos los efectos secundarios que pueden presentarse):**

- Malestar estomacal leve
- Diarrea
- Mareos
- Náuseas
- Gases
- Candidiasis
- Puede experimentar sensibilidad extrema al sol con la exposición prolongada a la luz solar o equipos de bronceado y puede causar sarpullido en la piel u otros efectos secundarios.

**Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presenta signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, lo que incluye entre otros:**

- Dificultad para respirar/opresión en el pecho
- Estrechamiento de la garganta
- Inflamación de los labios o la lengua
- Ampollas (bultos en la piel que pican mucho)

Ahora que tiene su medicamento, **no tenga relaciones sexuales (orales, vaginales, anales) hasta que haya completado el medicamento según las indicaciones.** El medicamento demora siete días en curar la clamidia. Si tiene relaciones sexuales durante estos primeros siete días, puede transmitir de todos modos la infección a sus parejas sexuales y usted puede volver a infectarse.

### **Próximos pasos:**

- Si tiene otras parejas sexuales, infórmeles que está recibiendo tratamiento para la clamidia, para que también puedan tratarse.
- Si cree que tiene síntomas de infección por clamidia y no desaparecen al cabo de siete días después de tomar este medicamento, consulte a su proveedor de servicios de salud para realizar otras pruebas y recibir tratamiento.
- Es muy probable que las personas que tienen infección por clamidia una vez vuelvan a tener, es recomendable que se realice una prueba después de cada pareja.
- Si tiene alguna pregunta sobre el medicamento, la clamidia u otra ETS, llame a su departamento de salud local.
- Use un método de barrera (condones o barrera dental) para prevenir futuras infecciones. Puede encontrar condones gratuitos en [www.KnoWyo.org](http://www.KnoWyo.org).