

Vacunas para niños y adolescentes

La vacunación es una de las mejores maneras en que los padres pueden proteger a los bebés, niños y adolescentes de muchas enfermedades graves. Las enfermedades prevenibles con vacunas pueden requerir hospitalización, o incluso ser mortales, especialmente para bebés y niños pequeños.



¿Qué vacunas necesita su hijo?

Visite la página web de los [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades](#) para obtener una herramienta de calendario de vacunas

[Wyoming Vaccination Requirements brochure \(pdf\)](#)

Otros enlaces

- [Buscar un proveedor de vacunas](#)
- [Más información en immunize.org](#)
- [Vacunas y seguridad de las vacunas](#)
- Solicitudes de registros
- Informes escolares e ISR
- Vacunas para adultos
- Vacunas obligatorias y exenciones

¿Le preocupa pagar las vacunas?

Visite la página web [Buscar un proveedor de vacunas](#).

Vacunas recomendadas, enumeradas por enfermedad





Haga clic en el nombre de una enfermedad para obtener más información sobre las enfermedades y las vacunas que las previenen en el sitio web de los [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades](#).

- [Varicela](#)
- [Vacuna contra el COVID-19](#)
- [Difteria](#)
- [Gripe \(influenza\)](#)
- [Hepatitis A](#)
- [Hepatitis B](#)
- [Hib \(Haemophilus influenzae tipo b\)](#)
- [VPH \(virus del papiloma humano\)](#)
- [Sarampión](#)
- [Enfermedad meningocócica](#)
- [Paperas](#)
- [Enfermedad neumocócica](#)
- [Polio \(poliomielitis\)](#)
- [Enfermedad por rotavirus](#)
- [Rubéola \(sarampión alemán\)](#)
- [Tétanos \(trismo\)](#)
- [Pertussis \(tos ferina\)](#)

2023: vacunas recomendadas para niños, desde el nacimiento hasta los 6 años

| Vaccine | Nacimiento | 1 mes | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 12 meses | 15 meses | 18 meses | 19-23 meses | 2-3 años | 4-6 años |
|--|------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|
| HepB Hepatitis B | HepB | HepB | | | HepB | | | | | | |
| RV* Rotavirus | | | RV | RV | RV* | | | | | | |
| DTaP Diphtheria, Pertussis, & Tetanus | | | DTaP | DTaP | DTaP | | DTaP | | | | DTaP |
| Hib* <i>Haemophilus influenzae</i> type b | | | Hib | Hib | Hib* | Hib | | | | | |
| PCV13, PCV15 Pneumococcal disease | | | PCV | PCV | PCV | PCV | | | | | |
| IPV Polio | | | IPV | IPV | IPV | | | | | | IPV |
| COVID-19** Coronavirus disease 2019 | | | | | COVID-19** | | | | | | |
| Flu† Influenza | | | | | Influenza (una o dos dosis al año) † | | | | | | |
| MMR Measles, Mumps, & Rubella | | | | | | MMR | | | | | MMR |
| Varicella Chickenpox | | | | | | Varicella | | | | | Varicella |
| HepA‡ Hepatitis A | | | | | | HepA‡ | | HepA‡ | | | |

Notas a pie de página

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>La administración de una tercera dosis a los 6 meses de edad depende de la marca de la vacuna contra Hib o el rotavirus usada para la dosis anterior.</p> |  <p>La cantidad de dosis recomendadas depende de la edad de su hijo y el tipo de vacuna contra el COVID-19 usada.</p> |  <p>Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que reciban por primera vez la vacuna contra la influenza (gripe) y para algunos otros niños en este grupo de edad.</p> |  <p>Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para que brinde protección duradera. Las 2 dosis deben administrarse entre los 12 y 23 meses de edad. Debe haber un intervalo de por lo menos 6 meses entre la administración de cada dosis. Los niños de 2 años o más que no hayan recibido 2 dosis de la vacuna HepA deben completar la serie.</p> |
|--|--|---|--|