

Educación sobre medicamentos contra la tuberculosis

Fecha de hoy: _____ Fecha de nacimiento del paciente: _____

Apellido del paciente: _____ Nombre: _____

Administrador de casos de tuberculosis: _____ Teléfono: _____

Al paciente se le ha diagnosticado: ☐ Tuberculosis latente ☐ Tuberculosis activa

➤ Informe a su proveedor de atención médica o enfermera si planea quedar embarazada o comenzar a amamantar mientras toma medicamentos contra la tuberculosis.

	Medicamentos	Posibles efectos secundarios	Comentarios
☐	Etambutol (EMB)	Pérdida de apetito, malestar estomacal, vómitos, entumecimiento y hormigueo en las manos y los pies.	Tome etambutol 1 hora antes o 2 horas después de los antiácidos. Informe a su médico si experimenta visión borrosa, incapacidad para ver colores, cambios repentinos en la visión, sarpullido o picazón.
☐	Isoniazida (INH)	Malestar estomacal	No consuma alcohol ni tome Tylenol (acetaminofeno) ni ningún medicamento con acetaminofeno mientras esté tomando isoniazida. Informe a su médico si tiene dolor en los ojos, cambios en la visión, entumecimiento y hormigueo en las manos o los pies, sarpullido, fiebre, glándulas inflamadas, dolor de garganta, sangrado o hematomas inusuales o dolor continuo que comienza en el estómago, pero termina en la espalda.
☐	Moxifloxacino (MOX)	Náuseas, acidez de estómago, vómitos, dolor de estómago, diarrea, estreñimiento, fotosensibilidad, entumecimiento y hormigueo en las manos o los pies.	Si está tomando antiácidos que contienen magnesio o aluminio o suplementos vitamínicos que contienen hierro o zinc, tome moxifloxacino al menos 4 horas antes o al menos 8 horas después de tomar cualquiera de estos medicamentos.
☐	Pirazinamida (PZA)	Malestar estomacal, fatiga, fotosensibilidad.	Llame a su médico si tiene sarpullido, fiebre, vómitos, pérdida de apetito, coloración amarillenta de la piel o los ojos, orina oscura, dolor e hinchazón en las articulaciones, sangrado o hematomas inusuales o dificultad para orinar.
☐	Rifampicina (RIF)	Coloración temporal (color amarillo, naranja rojizo o marrón) de la piel, los dientes,	Informe a su médico si tiene efectos secundarios graves o que no desaparecen. Si está tomando antiácidos, tome rifampicina al menos 1 hora antes de tomar los antiácidos. Si está usando

		la saliva, la orina, las heces, el sudor y las lágrimas; picazón, enrojecimiento, dolor de cabeza, somnolencia, mareos, falta de coordinación, dificultad para concentrarse, confusión, cambios de comportamiento, debilidad muscular, entumecimiento, dolor en los brazos, manos, pies o piernas, acidez estomacal, calambres estomacales, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea, gases, períodos menstruales dolorosos o irregulares, cambios en la visión.	anticonceptivos hormonales, debe utilizar otro método anticonceptivo mientras toma este medicamento. La rifampicina puede causar manchas rojas permanentes en sus lentes de contacto si los usa durante su tratamiento con rifampicina.
☐	Rifapentina (RPT)	Coloración temporal (color amarillo, naranja rojizo o marrón) de la piel, los dientes, la saliva, la orina, las heces, el sudor y las lágrimas; mareos, desmayos, aumento de la sudoración.	Si está usando anticonceptivos hormonales, debe utilizar otro método anticonceptivo mientras toma este medicamento. No amamante mientras esté tomando rifapentina. La rifapentina puede provocar que la leche materna se torne de color naranja rojizo. La rifapentina puede causar manchas rojas permanentes en sus lentes de contacto o dentaduras postizas. Si tiene alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato: diarrea (hasta 2 meses después de su tratamiento), sarpullido, picazón, urticaria, tos con sibilancia, dificultad para respirar, ojos enrojecidos, con picazón o irritados, fiebre, ampollas, cambios en el pensamiento y el comportamiento, hinchazón de los ojos, la cara, los labios, la lengua, la garganta, los brazos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas, latidos cardíacos rápidos o irregulares, náuseas, vómitos, dolor en el pecho, síntomas parecidos a la gripe como fiebre, escalofríos, dolores musculares, cansancio y dolor de cabeza, dolor de estómago, pérdida de apetito, orina oscura, dolor o hinchazón de las articulaciones o coloración amarillenta de la piel o los ojos.

Fuente: <https://medlineplus.gov/druginformation.html>